

# Tarjeta de dosis

Diluir ▼BRIUMVI® (ublituximab) en una bolsa de perfusión que contenga solución inyectable de NaCl al 0,9 %

Consultar la Ficha técnica del producto para obtener más información.

Administrar y subadministrar BRIUMVI® por un profesional sanitario experimentado con acceso a la asistencia médica adecuada para tratar reacciones graves, como reacciones graves relacionadas con la perfusión.

## PRIMERA PERFUSIÓN

**1** VELOCIDAD DE PERFUSIÓN

30 primeros min  
**10 ml/h**

30 min siguientes  
**20 ml/h**

1 hora siguiente  
**35 ml/h**

2 horas restantes  
**100 ml/h**

DOSIS DE BRIUMVI  
**150 mg**

VOLUMEN TOTAL  
**250 ml**

DURACIÓN TOTAL\*

**4 h**

## SEGUNDA PERFUSIÓN 2 semanas después de la primera perfusión

**2** VELOCIDAD DE PERFUSIÓN

30 primeros min  
**100 ml/h**

30 min restantes  
**400 ml/h**

DOSIS DE BRIUMVI  
**450 mg**

VOLUMEN TOTAL  
**250 ml**

DURACIÓN TOTAL\*

**1 h**

## PERFUSIONES POSTERIORES Una vez cada 24 semanas

●●● VELOCIDAD DE PERFUSIÓN

30 primeros min  
**100 ml/h**

30 min restantes  
**400 ml/h**

DOSIS DE BRIUMVI  
**450 mg**

VOLUMEN TOTAL  
**250 ml**

DURACIÓN TOTAL\*

**1 h**

Administrar la primera perfusión posterior 24 semanas después de la primera perfusión. Debe mantenerse un intervalo mínimo de 5 meses entre cada dosis de BRIUMVI.

Briumvi se administra como perfusión intravenosa a través de una vía exclusiva. Las perfusiones de Briumvi no deben administrarse en forma de perfusión intravenosa lenta o en bolo.

Premedicar con un **corticosteroide** (p. ej., 100 mg de metilprednisolona o 10–20 mg de dexametasona o equivalente) y **difenhidramina**, administrado por vía oral, intravenosa, intramuscular o subcutánea aproximadamente **30–60 minutos** antes de cada perfusión para reducir la frecuencia y la gravedad de las reacciones relacionadas con la perfusión (RRP). También se puede considerar la adición de un antipirético (p. ej., paracetamol).

Observar a los pacientes durante al menos una hora después de la finalización de las dos primeras perfusiones por si aparecen síntomas de RRP. Las perfusiones posteriores no requieren vigilancia tras la perfusión a menos que se hayan observado RRP y/o hipersensibilidad. Informar al paciente de que las reacciones relacionadas con la perfusión pueden producirse hasta 24 horas después de la perfusión.

 **briumvi**<sup>®</sup>  
Ublituximab 150mg/6ml  
Perfusión IV

\* La duración de la perfusión puede ser mayor si se interrumpe o ralentiza. PO: poliolefin; PVC: cloruro de polivinilo. Esta tarjeta de dosis no sustituye a la Ficha técnica del producto. Consultar la información de seguridad importante seleccionada en el reverso de esta tarjeta y la Ficha técnica del producto para obtener más información.

 **NEURAXPHARM**<sup>®</sup>  
Tu especialista en SNC

# Tarjeta de dosis

Diluir ▼BRIUMVI® (ublituximab) en una bolsa de perfusión que contenga solución inyectable de NaCl al 0,9 %

Consultar la Ficha técnica del producto para obtener más información.

Administrar y subadministrar BRIUMVI® por un profesional sanitario experimentado con acceso a la asistencia médica adecuada para tratar reacciones graves, como reacciones graves relacionadas con la perfusión.

## Contenido mínimo para Briumvi®

- **150 mg concentrado para solución para perfusión** - 1 vial (CN:763751).
- **PVP notificado:** 3.323,33€. **PVP IVA notificado:** 3.456,26€

Financiado en España por el SNS para determinadas condiciones. Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. Consulta la ficha técnica completa antes de prescribir el medicamento.

Ficha Técnica



## REFERENCIA

Ficha técnica de BRIUMVI (ublituximab). Disponible en [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1231730001/FT\\_1231730001.html.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1231730001/FT_1231730001.html.pdf) Fecha de última consulta Julio del 2024.

Esta tarjeta de dosis de perfusión no sustituye a la Ficha técnica del producto. Consultar la información de seguridad importante seleccionada en el reverso de esta tarjeta y la Ficha técnica del producto para obtener más información.

